

Prévalence et spectre des maladies auto-immunes associées à la maladie cœliaque

Hajer HASSINE, AHU, Service de Gastro-entérologie «B», C.H.U La Rabta, Tunis, Tunisie

- Habiba DABBEBI, Professeur agrégé, Service de Gastro-entérologie»B», C.H.U La Rabta, Tunis, Tunisie
- Nesrine KRIFA, Résidente, Service de Gastro-entérologie «B», C.H.U La Rabta, Tunis, Tunisie
- Nadia BEN DOUISSA, Spécialiste, Service de Gastro-entérologie «B», C.H.U La Rabta, Tunis, Tunisie
- Souhir MONASTIRI, Résidente, Service de Gastro-entérologie «B», C.H.U La Rabta, Tunis, Tunisie
- Haithem YACOUB, AHU, Service de Gastro-entérologie «B», C.H.U La Rabta, Tunis, Tunisie
- Dhouha CHERIF, AHU, Service de Gastro-entérologie «B», C.H.U La Rabta, Tunis, Tunisie
- Hela KCHIR, Professeur agrégé, Service de Gastro-entérologie»B», C.H.U La Rabta, Tunis, Tunisie
- NAdia MAAMOURI, Professeur, Service de Gastro-entérologie»B», C.H.U La Rabta, Tunis, Tunisie

➤ Introduction :

- La maladie cœliaque (MC) est une entéropathie chronique auto-immune (AI) survenant chez des patients génétiquement prédisposés.
- La survenue de maladies auto-immunes (MAI) associées est dix fois plus fréquente que la population générale.


➤ Patients et Méthodes :

- Etude rétrospective colligeant tous les patients suivis pour MC au service de Gastroentérologie sur une période de 31 ans [Janvier 1993- Décembre 2023].
- Les MAI associées étaient notées.

- **Objectif :** Déterminer la prévalence et le type des MAI associées à la MC, d’étudier leur impact sur l’évolution de la MC.

➤ Résultats :

- 104 patients ; Age moyen: 26 ans [1 - 69 ans] ; Genre-ratio (H/F) : 0,2
- Le diagnostic de la MC: l’étude histologique des biopsies duodénales + la sérologie de la MC



- Un régime sans gluten (RSG) était prescrit chez tous les patients en plus du traitement spécifique de la MAI.
- Ces maladies étaient stabilisées sous traitements spécifiques mais n’avaient pas d’impact sur le cours évolutif de la MC sous RSG.

➤ Conclusion :

- Une MAI associée à la MC était présente chez près de l’un tiers des patients, dominées par les manifestations endocriniennes, hépatiques et les maladies de système. Ces résultats soulignent l'importance d'un dépistage systématique et d'un suivi multidisciplinaire pour une prise en charge optimale.