

Pneumopathie interstitielle diffuse au cours des myopathies inflammatoires : Quels facteurs prédictifs ?

1^{er} Auteur : Ines, NACEUR, Professeur Agrégée, Médecine Interne, CHU La Rabta, Tunis, TUNISIE

Autres auteurs, équipe :

- Marwen, HAMMI, Résident, Médecine Interne, CHU La Rabta, Tunis, TUNISIE
- Tayssir, BEN ACHOUR, Assistante hospitalo-universitaire, Médecine Interne, CHU La Rabta, Tunis, TUNISIE
- Mayssam, JRIDI, Assistante hospitalo-universitaire, Médecine Interne, CHU La Rabta, Tunis, TUNISIE
- Amal Baya, CHATTI, Assistante hospitalo-universitaire, Médecine Interne, CHU La Rabta, Tunis, TUNISIE
- Imed, BEN GHORBEL, Professeur, Médecine Interne, CHU La Rabta, Tunis, TUNISIE
- Monia, SMITI, Professeur, Médecine Interne, CHU La Rabta, Tunis, TUNISIE
- Fatma, SAID, Professeur Agrégée, Médecine Interne, CHU La Rabta, Tunis, TUNISIE


Introduction :

Les myopathies inflammatoires (MI) sont un groupe hétérogène de maladies auto-immunes affectant le muscle squelettique, avec un risque d’atteinte pulmonaire. La pneumopathie interstitielle diffuse (PID) représente une complication fréquente et grave, influençant le pronostic vital des patients. L’objectif de cette étude est d’identifier les facteurs prédictifs de survenue de la PID chez les patients atteints de myopathies inflammatoires.

Méthodes :

Il s’agit d’une étude rétrospective incluant des patients atteints de MI diagnostiquées selon des critères cliniques, biologiques et histologiques. Les dossiers médicaux ont été recueillis entre 2000 et 2021. La PID a été définie par la présence d’anomalies compatibles à la tomodensitométrie (TDM) thoracique haute résolution. Les patients ont été divisés en deux groupes : G1 (patients avec PID) et G2 (patients sans PID). Les caractéristiques cliniques, biologiques et immunologiques ont été comparées entre les deux groupes.

Résultats :



Conclusion :

Dans notre série, la PID était associée à un âge plus avancé, des manifestations musculaires plus fréquente et la présence d’anticorps anti-Ro52. Ces résultats permettent d’élaborer une stratégie de dépistage précoce de la PID afin de limiter la morbidité et la mortalité associées à cette complication pulmonaire.

