L'histoire d'une folliculite décalvante de Quinquaud rebelle

1^{er} Auteur : Hazem Sehweil , Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunisie

Autres auteurs, équipe:

- Malek ben slimene , Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis,Tunisie
- Ghofrane ouareche , Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis,Tunisie
- Kehna jabeur , Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis,Tunisie
- Raouf dhaoui , Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis,Tunisie

Introduction

- La folliculite décalvante de Quinquaud (FDQ) est une alopecie cicatricielle inflammatoire rare caractérisée par des pustules folliculaires récurrentes évoluant en plaques alopeciques permanentes.
- Le traitement comprend généralement des antibiotiques et des rétinoïdes, mais les formes réfractaires nécessitent des stratégies thérapeutiques alternatives, telles que thérapies biologiques ciblées.

Observation

Patient : Homme de 27 ans, suivi pour maladie de Crohn depuis 2019, traité par azathioprine.

Antécédents dermatologiques : Pustules récidivantes du cuir chevelu évoluant depuis 7 ans, associées à prurit et brûlures.

Examen clinique :

- Plaques alopeciques cicatricielles
- Pustules folliculaires
- Croûtes jaunâtres
- Squames épaisses

Trichoscopie :

- Polytrichie
- Pustules folliculaires
- Hyperkératose folliculaire
- Zones cicatricielles

Biopsie cutanée :

- Acanthose avec exocytose neutrophilique
- Infiltrat inflammatoire mixte : PNN, lymphocytes, plasmocytes

Diagnostic : Folliculite décalvante.

Traitements antérieurs : Dermocorticoïdes, cyclines, isotrétinoïne → échec thérapeutique.

Prise en charge :

- Traitement hors AMM par adalimumab :
  - 160 mg à J0
  - 80 mg à J15
  - 40 mg toutes les 2 semaines

Évolution :

- Amélioration significative dès 3 mois : diminution des pustules, stabilisation de l'alopecie
- Aucun effet indésirable rapporté

Discussion

- La **folliculite décalvante (FDQ)** est une dermatose neutrophilique chronique du cuir chevelu.
- Son **étiopathogénie** impliquerait une **réponse immunitaire inadaptée** aux antigènes **staphylococciques**, à médiation cellulaire.
- Cette réponse induit une **augmentation du TNF α** , cytokine pro-inflammatoire impliquée dans la destruction folliculaire.
- Le **blocage du TNF α** par l'adalimumab constitue donc une **option thérapeutique logique**, en particulier dans les formes **résistantes**.
- Le succès des **anti-TNF α dans d'autres dermatoses neutrophiliques** (ex. : pyoderma gangrenosum) renforce leur intérêt dans la FDQ réfractaire.
- Dans notre cas, une **amélioration clinique rapide et significative** a été observée sous adalimumab, sans effets secondaires notables.
- Ces résultats sont **en accord avec les données limitées mais prometteuses** de la littérature existante.

conclusion

- Ce cas met en évidence **l'efficacité potentielle de l'adalimumab** dans le traitement des formes **réfractaires de folliculite décalvante**.
- Il souligne l'intérêt des **biothérapies ciblées** dans certaines dermatoses inflammatoires chroniques.
- Des **études supplémentaires** sont nécessaires pour confirmer son **efficacité** et établir son **profil de tolérance** dans cette indication encore hors AMM.