

## Lymphomes gastriques B à grandes cellules compliqués

**1<sup>er</sup> Auteur : Ghada, GHARBI, AHU, Service de gastro-entérologie, Hôpital Mohamed Taher Maamouri, Nabeul, Tunisie**

Autres auteurs, équipe:

- Amal, KHSIBA, Professeur agrégé, Service de gastro-entérologie, Hôpital Mohamed Taher Maamouri, Nabeul, Tunisie
- Emna, CHELBI, Professeur agrégé, Service d'anatopathologie, Hôpital Mohamed Taher Maamouri, Nabeul, Tunisie
- Asma, BEN MOHAMED, AHU, Service de gastro-entérologie, Hôpital Mohamed Taher Maamouri, Nabeul, Tunisie
- Manel, YAKOUBI, AHU, Service de gastro-entérologie, Hôpital Mohamed Taher Maamouri, Nabeul, Tunisie
- Mofida, MAHMOUDI, Professeur agrégé, Service de gastro-entérologie, Hôpital Mohamed Taher Maamouri, Nabeul, Tunisie
- Mouna, MEDHIOUB, Professeur agrégé, Service de gastro-entérologie, Hôpital Mohamed Taher Maamouri, Nabeul, Tunisie
- Lamine, HAMZAOUI, Professeur agrégé, Service de gastro-entérologie, Hôpital Mohamed Taher Maamouri, Nabeul, Tunisie

### Introduction :

Le lymphome diffus à grandes cellules B gastrique (LGCBG) fait partie des tumeurs les plus agressives avec une évolution rapide et un pronostic réservé. Plusieurs complications peuvent y être associées.

### But et méthodes :

Le but de notre étude était d'étudier la fréquence et les facteurs associés aux complications au cours des LGCBG.

Il s'agit d'une étude rétrospective multicentrique menée dans des services de gastro-entérologie dans 4 centres hospitalo-universitaires tunisiens entre 2005 à 2020 incluant les patients ayant LGCBG.

#### ETUDE DESCRIPTIVE

- ✓ 44 patients
- ✓ Age Moyen : 59 ans
- ✓ H/F : 1.9

Des complications étaient observées chez 22,7% des patients

Pour l'hémorragie digestive, le lymphome a été localisé au niveau du fundus chez 2 patients, au niveau du corps chez un patients et diffus chez 4 avec la présence d'un processus ulcéro-bourgeonnant chez un seul patient, des gros plis chez 3 et des ulcérations chez 5. L'hémorragie digestive a été jugulé par le traitement médical. La perforation était fundique chez un patient et antrale chez l'autre. Les deux patients ont été opérés.

AnnArbor	%
IE	15.9
IIE1	18.2
IIE2	38.6
III	18.2
IV	9.1

Répartition des LGCBGs selon la classification d'Ann Arbor

Complications	%
Hémorragie digestive	70
Perforation	20
Syndrome de lyse tumoral	10

Répartition des LGCBGs selon le type de complication

### Etude analytique

Ni l'aspect morphologique du lymphome ( $p=0.09$ ), ni son stade selon la classification d'Ann Arbor ( $p=0.2$ ), ni l'index pronostique international ( $p=0.1$ ) n'était corrélé à la survenue de complications.

### Conclusion :

Le LGCBG représente un type agressif de lymphome pouvant être émaillé de plusieurs complications dont la prise en charge doit être précoce et adéquate pour améliorer son pronostic.