

### Apport des questionnaires de qualité de vie : The Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36) et The Behçet's Disease specific measure of quality of life (BD-QoL) au cours de la maladie de Behçet

Ben hassine Imen, assistante hospitalo-universitaire, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie

- Timoumi Mayssa, résidente en médecine, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Baya wafa, assistante hospitalo-universitaire, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Adaily najeh, assistante hospitalo-universitaire, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Anoun jihed, professeure agrégée, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Karmani monia, médecin spécialiste, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Mzabi anis, professeur, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Rezgui amel, professeure agrégée, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Ben fredj fatma, professeure, CHU sahloul, Sousse, Tunisie

#### Introduction :

- La maladie de Behçet est une pathologie inflammatoire systémique caractérisée par des lésions récurrentes affectant divers organes, notamment les muqueuses, les yeux, la peau et le système vasculaire.
- Bien que les progrès dans la gestion de cette maladie aient permis une amélioration du pronostic à court et moyen terme, les patients continuent de souffrir de symptômes chroniques et invalidants d'où le retentissement significatif sur la qualité de vie.

#### Objectifs :

Evaluer la qualité de vie des patients atteints d'une maladie de Behçet.


#### Méthodes :

*Type d'étude* : étude descriptive transversale analytique.

*Population* : patients suivis pour maladie de Behçet au service de Médecine Interne de l'hôpital Sahloul.

*Période d'inclusion* : 20 mois.

#### Résultats :



- Il y avait une association statistiquement significative entre les différents domaines des deux questionnaires.
- Le BD QoL était influencé par tous les domaines du SF-36 sauf le domaine du fonctionnement physique. Les deux paramètres influençant négativement la qualité de vie : **l'âge tardif au moment du diagnostic et l'atteinte oculaire.**

Corrélation SF-36 / BD-QoL	
Patients avec BD-QoL altéré	SF-36 moyen = 39,35
Patients avec BD-QoL normal	SF-36 moyen = 66,08
Corrélation significative (p < 0,001)	

- Selon le score d'activité BDCAF, dix patients avaient une maladie active (28,6 %) au moment de l'évaluation. L'activité de la maladie était associée à une qualité de vie altérée. L'atteinte articulaire et les céphalées, actives au cours des 4 dernières semaines précédant l'entretien, influençaient négativement la qualité de vie.
- En ce qui concerne l'influence des différents traitements utilisés dans la prise en charge de la MB sur la qualité de vie :

Corticoides	↑ Score physique & BD-QoL
Azathioprine	↑ Santé générale
Cyclophosphamide	↓ Qualité de vie

#### Conclusion :

Les deux questionnaires mettaient le point sur le fait que la maladie de Behçet peut avoir un impact majeur sur la qualité de vie. Une prise en charge globale est recommandée afin de promouvoir un meilleur pronostic

