

État des lieux de la sexualité des patients atteints de la maladie de Behçet : expérience tunisienne

Ben hassine Imen, assistante hospitalo-universitaire, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie

- Timoumi Mayssa, résidente en médecine, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Baya wafa, assistante hospitalo-universitaire, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Adaily najeh, assistante hospitalo-universitaire, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Anoun jihed, professeure agrégée, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Karmani monia, médecin spécialiste, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Mzabi anis, professeur, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Rezgui amel, professeure agrégée, médecine interne, CHU sahloul, Sousse, Tunisie
- Ben fredj fatma, professeure, CHU sahloul, Sousse, Tunisie

Introduction :

La maladie de Behçet (MB) est une vascularite systémique rare qui touche les vaisseaux de tout calibre. Par ailleurs, l'impact de cette maladie sur la sexualité des patients reste largement négligé. Une dysfonction sexuelle de mécanismes multiples peut constituer le principal handicap chez la jeune population concernée essentiellement par cette pathologie.

Objectifs :



Evaluer la sexualité des patients atteints d'une MB.

Méthodes :

- *Type d'étude* : étude transversale analytique
- *Population d'étude* : les patients suivis pour MB au service de Médecine Interne de l'hôpital Sahloul
- *Période d'étude*: 20 mois.
- L'activité de la maladie était mesurée par le score : Behçet Disease Current Activity Form (BDCAF). L'évaluation de la sexualité était faite par les scores : The 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) pour les hommes et The Female Sexual Function Index (FSFI) pour les femmes.

Résultats :

- 4 patients: pas d'activité sexuelle au moment de l'entretien
- 1 patient: non consentant pour le questionnaire de sexualité
- D'où l'étude de la sexualité.



- Le score IIEF-5 médian était de 19 avec des valeurs extrêmes allant de 5 à 24 chez les patients de sexe masculin. Une dysfonction érectile était rapportée chez 19 patients (82.6 %). La sexualité féminine était altérée chez 5 patientes (71.4%) avec un score FSFI moyen à 23.5 +/- 4.1 avec des valeurs extrêmes allant de 15.4 à 26.9.
- Le domaine du désir était altéré chez toutes les patientes.
- La fonction sexuelle était indépendante de tous les paramètres socio-démographiques et des manifestations cliniques. Seule l'atteinte vasculaire était associée à une altération de la sexualité masculine. En effet, il s'agissait de l'atteinte des veines péniennes dans le cadre d'une insuffisance veineuse ou de thrombose.

Conclusion :

La dysfonction sexuelle constitue un aspect perturbé généralement sous-estimé de la maladie de Behçet. Elle peut être altérée par des mécanismes à la fois organiques et psychogènes.